



УДК 577.113.4

## ОДНОВРЕМЕННОЕ ВСТРАИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ dU И dC В РАСТУЩУЮ ЦЕПЬ ДНК В РЕАКЦИИ УДЛИНЕНИЯ ПРАЙМЕРА И ПЦР

© 2020 г. А. В. Чудинов\*, В. Е. Шершов\*, А. С. Павлов\*,  
О. С. Волкова\*, В. Е. Кузнецова\*, А. С. Заседателев\*, С. А. Лапа\*, #

\*ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова 32

Поступила в редакцию 04.04.2020 г.

После доработки 15.04.2020 г.

Принята к публикации 18.04.2020 г.

Изучена субстратная эффективность модифицированных производных 2'-дезоксигуанидин (mod-dUTP) и 2'-дезоксигуанидин-5'-трифосфатов (mod-dCTP) при их одновременном введении в реакции удлинения праймера (РЕХ) и ПЦР с полной заменой природных дезокситимидина (dT) и дезоксицитидина (dC). Применены полимеразы с отсутствующей 3'-5' экзонуклеазной активностью: Taq и Vent (exo-), а также природные и сконструированные ДНК-матрицы. Получены фрагменты ДНК, модифицированные одновременно двумя типами нуклеотидов как с аналогичными, так и с различными функциональными группами. Исследования важны для получения аптамеров с расширенными свойствами.

*Ключевые слова:* модифицированные нуклеотиды, модифицированные ДНК, реакция удлинения праймера, ПЦР, аптамеры

DOI: 10.31857/S0132342320050061

### ВВЕДЕНИЕ

Аптамеры – РНК- или ДНК-олигонуклеотиды, способные проявлять аффинное сродство к биомолекулам. Введение модификаций в аптамеры позволяет изменить их физико-химические свойства и увеличить сродство к их мишеням [1, 2]; наиболее широко применяются ферментативные методы с использованием модифицированных трифосфатов дезоксинуклеозидов. Одновременное встраивание нуклеотидов с различными модификациями в одну растущую цепь ДНК способно изменить свойства получаемых модифицированных аптамеров, аптазимов и ДНК-зондов [3]. В настоящей работе проанализированы особенности одновременного встраивания в растущую цепь ДНК модифицированных dUTP и dCTP как с аналогичными, так и с различными функциональными модификациями.

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследовали субстратные свойства модифицированных аналогов дезоксинуклеозидов (mod-dUTP и mod-dCTP), структуры которых приведе-


ны на рис. 1. Проводили реакцию удлинения праймера (РЕХ) и ПЦР при одновременном введении mod-dUTP и mod-dCTP в реакционную смесь с полным замещением природных dTTP и dCTP. Создавали пары dU + dC с аналогичными и с различными модификациями. В качестве матриц для РЕХ и ПЦР применяли синтетические олигонуклеотиды и бактериальную ДНК, соответственно. Использовали ДНК-полимеразы Taq и Vent (exo-). Синтетические матрицы содержали участки для последовательного включения 1, 2, 3 и 4 модифицированных нуклеотидов.

В РЕХ с синтетическими матрицами Taq-полимераза воспринимала модифицированные производные dU, но показала слабую субстратную совместимость с mod-dC. Выходы продукта около 30% удалось получить лишь для 5-пропинил-производного. Введение в реакцию dCTP с массивным заместителем (индол) приводило к получению неполноразмерных продуктов либо полному их отсутствию. В парах модифицированных dU + dC выход реакции зависел от более “сложного” для полимеразы субстрата в паре, а именно модифицированного dC, и не превышал 10%. Для модифицированных dU удалось получить полноразмерные продукты для dU-i и dU-p с выходом около 30%.


Полимераза Vent (exo-) показала способность встраивать субстрат с гетероциклической моди-

Сокращения: mod-dUTP – модифицированный 2'-дезоксигуанидин-5'-трифосфат; mod-dCTP – модифицированный 2'-дезоксигуанидин-5'-трифосфат.

# Автор для связи: (тел.: +7 (495) 135-98-00; факс: +7 (495) 135-14-05; эл. почта: lapa@biochip.ru).



**Рис. 1.** Модифицированные трифосфаты дезоксиуридина (слева) и дезоксицитидина (справа). dU-i и dC-i – производные, содержащие на пиримидиновых основаниях фрагменты 3-индолпропионовой кислоты, dU-p и dC-p – производные, содержащие на пиримидиновых основаниях 5-пропинил.



**Рис. 2.** (а) РЕХ с применением модельных матричных олигонуклеотидов M2UC и M2CU (длина 49 нт). На примере Vent (exo-) ДНК-полимеразы. Ladder – маркер длин продуктов GeneRuler 50bp; пары использованных dNTP указаны над соответствующими лунками геля. Сверху каждой фореграммы указана использованная синтетическая матрица. Различная подвижность продуктов в геле, по-видимому, обусловлена структурными различиями модификаций. При выбранном временном интервале элонгации праймера наблюдается наличие полноразмерных продуктов реакции. (б) ПЦР с применением бактериальной ДНК-матрицы. Сверху каждой фореграммы указана использованная полимеразы. Окрашивание бромистым этидием.

фикацией (индол). В парах с различными модификациями выход определялся наиболее сложным субстратом, как и в случае Taq-полимеразы. Однако, в случае Vent (exo-) во всех вариантах комбинаций удалось получать полноразмерные продукты. Результат проведения РЕХ с Vent (exo-) полимеразой представлен на рис. 2а.

В случае ПЦР использовали те же комбинации модифицированных трифосфатов. В качестве матрицы использовали фрагмент гена groV *Mycobacterium tuberculosis* длиной 126 п.о. [4]. На рис. 2б показан результат ПЦР как для индивидуального применения разноименных нуклеотидов (mod-dU или mod-dC), так и для совместного введения

(mod-dU + mod-dC) в различных комбинациях. Из электрофореграмм видно, что Taq-полимераза способна встраивать некоторые модифицированные dU, но модифицированные dC оказываются для нее более сложным субстратом, что хорошо коррелирует как с полученными ранее данными [5], так и с результатами РЕХ настоящего исследования.

Анализ методом ПЦР в режиме реального времени показывает, что производные с менее объемными функциональными группами (dU-p и dC-p) демонстрируют высокую скорость накопления продукта, в то время как массивные (dU-i и dC-i) демонстрируют либо пологую кривую накопления сигнала, либо задержку порогового цикла ( $C_T$ ) в зависимости от использованной комбинации dU + dC. Поскольку в ПЦР временные интервалы элонгации праймеров гораздо меньше, чем в РЕХ, ингибирующее влияние модифицированных производных проявлялось сильнее. Увеличение времени элонгации праймеров может привести к большим выходам целевого продукта.

Наиболее сложным субстратом для Vent (exo-) оказался dC-i (индол). При индивидуальном применении для него удается получить полноразмерный продукт. Но в комбинации с модифицированными dU видно большое количество неполноразмерных продуктов.

Полимераза Vent (exo-) применима для проведения одновременного встраивания разноименных модифицированных трифосфатов в растущую цепь ДНК методом РЕХ при использовании матриц, содержащих последовательно от 1 до 4 повторов встраивания модифицированных производных. Показана возможность применения полимеразы Vent (exo-) в ПЦР для одновременного попарного введения разноименных модифицированных трифосфатов дезоксинуклеозидов (mod-dU + mod-dC) с различными модификациями. Эффективность амплификации зависит от природы введенных модификаций.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

### *Модифицированные аналоги трифосфатов дезоксинуклеозидов*

Соединения dU-i и dC-i синтезированы в ИМБ РАН, соединения dU-p и dC-p произведены Trilink Biotechnologies (США). Структуры соединений приведены на рис. 1.

### *ДНК-матрицы*

В работе использован фрагмент гена groV *M. tuberculosis* [4] для ПЦР и синтетические ДНК-матрицы для РЕХ длиной 49 нт, последовательности которых приведены ниже,

---

**M1C** 5'-СТ**GGGG**СТСТ**GGG**СТСТ**GG**СТСТ**GT**-GGCTACCAGTATGGAGCTGACAG-3'  
**M1U** 5'-СТ**AAAA**СТСТ**AAA**СТСТ**AA**СТСТ**ACT**-GGCTACCAGTATGGAGCTGACAG-3'  
**M2CU** 5'-СТ**AGAG**СТСТ**GAG**СТСТ**AG**СТСТ**GT**-GGCTACCAGTATGGAGCTGACAG-3'  
**M2UC** 5'-СТ**GAGA**СТСТ**AGA**СТСТ**GA**СТСТ**ACT**-GGCTACCAGTATGGAGCTGACAG-3'

---

Полужирным шрифтом отмечены нуклеотиды, комплементарные исследуемому. Курсивом выделен праймерный участок.

### *Реакция удлинения праймера (РЕХ)*

Реакционная смесь содержала природные dATP и dGTP в концентрации 0.2 мМ каждого, а также различные сочетания трифосфатов дезоксинуклеозидов, указанные на рис. 2; 1.5 U Taq- либо 0.5 U Vent (exo-) ДНК-полимеразы (реакционный буфер соответствовал примененной полимеразе); праймер для РЕХ; одну из синтетических матриц. Реакцию проводили на ДНК-амплификаторе MiniCycler (MJ Research, США) по следующей программе: 5 мин при 95°C; далее 30 с при 65°C и 40 минут при 72°C.

### *Полимеразная цепная реакция (ПЦР)*

Реакционная смесь для ПЦР была аналогична примененной для РЕХ. В качестве матрицы использовали фрагмент гена groV *M. Tuberculosis* и соответствующие праймеры. Температурно-временной профиль ПЦР состоял из предварительной денатурации при 95°C в течение 3 мин, за которой следовал 31 цикл: 95°C в течение 30 с, 65°C в течение 30 с, 72°C в течение 40 с и далее завершающая инкубация при 72°C в течение 5 мин.

### *ПЦР в режиме реального времени*

Для визуализации процесса в реакционную смесь добавляли краситель EvaGreen (Biotium, Россия). Амплификацию проводили на приборе IQ5 (Bio-Rad, США).

*Определение выхода продуктов амплификации*

Полученные ПЦР-продукты разделяли в 4% агарозном геле. Окрашивание проводили бромидом этидия. Количество продукта оценивали по оптической плотности соответствующих полос в дорожках геля с использованием программы ImageJ (NIH, США).

## ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-04-01217.

## СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

## КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rohloff J.C., Gelinas A.D., Jarvis T.C., Ochsner U.A., Schneider D.J., Gold L., Janjic N. // *Mol. Ther. Nucleic Acids*. 2014. V. 3. e201. <https://doi.org/10.1038/mtna.2014.49>
2. Tolle F., Mayer, G. // *Chem. Sci*. 2013. V. 4. P. 60–67. <https://doi.org/10.1039/c2sc21510a>
3. Gawande B.N., Rohloff J.C., Carter J.D., von Carlowitz I., Zhang C., Schneider D.J., Janjic N. // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2017. V. 114. P. 2898–2903. <https://doi.org/10.1073/pnas.1615475114>
4. Mikhailovich V., Lapa S., Gryadunov D., Sobolev A., Strizhkov B., Chernyh N., Skotnikova O., Irtuganova O., Moroz A., Litvinov V., Vladimirkii M., Perelman M., Cherenousova L., Erokhin V., Zasedatelev A., Mirzabekov A. // *J. Clin. Microbiol.* 2001. V. 39. P. 2531–2540. <https://doi.org/10.1128/JCM.39.7.2531-2540.2001>
5. Лана С.А., Гусейнов Т.О., Павлов А.С., Шершов В.Е., Кузнецова В.Е., Заседателев А.С., Чудинов А.В. // *Биоорган. химия*. 2020. Т. 46. № 4. С. 411–417. [Lapa S.A., Gusejnov T.O., Pavlov A.S., Shershov V.E., Kuznetsova V.E., Zasedatelev A.S., Chudinov A.V. // *Rus. J. Bioorg. Chem.* 2020. V. 46. P. 551–556.] [doi 10.1134/S106816202004010X](https://doi.org/10.1134/S106816202004010X)

## Simultaneous Incorporation of Modified dU and dC Derivatives in the Growing DNA Chain Using PEX and PCR

A. V. Chudinov\*, V. E. Shershov\*, A. S. Pavlov\*,  
O. S. Volkova\*, V. E. Kuznetsova\*, A. S. Zasedatelev\*, and S. A. Lapa\*, #

\*Phone: +7 (495) 135-98-00; fax: +7 (495) 135-14-05; e-mail: lapa@biochip.ru

\*Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, ul. Vavilova 32, Moscow, 119991 Russia

The substrate efficiency of modified derivatives of 2'-deoxyuridine-(mod-dUTP) and 2'-deoxycytidine-5'-triphosphates (mod-dCTP) was studied in the regime of simultaneous incorporation using the primer elongation reaction (PEX) and PCR with complete replacement of natural deoxythymidine (dT) and deoxycytidine (dC). Polymerases with missing 3'-5' exonuclease activity were used: Taq and Vent (exo-), as well as natural and constructed DNA templates. DNA fragments modified simultaneously by two types of nucleotides with similar and different functional groups were obtained. Research is important for obtaining aptamers with extended properties.

*Keywords: modified nucleotides, modified DNA, primer extension reaction, PCR, aptamers*